

※:2023년 3월 개정

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

SEIROGAN
Quick C

복용하실 때에는 이 첨부문서(설명문서)를 반드시 읽어주십시오. 또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.



大幸薬品

正露丸クイックC

제2종 의약품

위장약

정로환 퀵C(正露丸クイックC)

정로환 퀵C는 100년 이상 전부터 가정에서 복용되고 있는 “정로환”에 배합되어 있는 생약성분인 일본약국방(약전) 목크레오소트가 빠르게 녹는 액체 캡슐입니다. 일본약국방 목크레오소트는 너도밤나무나 소나무에서 얻을 수 있는 투명한 액체로 장 속의 수분균형을 조정하고 장의 운동을 멈추지 않으면서 정상적인 상태로 돌려놓는 효과를 발휘합니다. 통근, 통학이나 외출했을 때 갑자기 설사나 묽은 변이 나올 것 같을 때 정로환 퀵C로 서둘러 대처하시길 추천 드립니다.



[복용상 주의사항]

상담이 필요한 경우



1. 다음 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 발열을 수반한 설사 환자, 혈변이 있는 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
 - (3) 고령자 (신장이나 간 등의 생리기능이 저하되어 있을 경우가 많아서 약이 강하게 작용될 수 있습니다.)
2. 복용 후에 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용 우려가 있으니 즉시 복용을 중지하고 이 첨부 문서(설명서)를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.

관련 부위	증상
소화기	식욕부진, 위장의 불편감

(주성분인 목크레오소트는 다량으로 복용할 경우 위장장애가 나타나며 식욕이 감퇴할 수도 있습니다.)

3. 5~6일간 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고, 이 첨부문서(설명서)를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.

(뒷면으로 이어집니다)

[효 능]

설사, 소화불량으로 인한 설사, 체증, 구토, 배탈, 묽은 변

[용법 · 용량]

다음 양을 하루 3회를 한도로 반드시 물 혹은 뜨거운 물과 함께 복용해 주십시오. 복용 간격은 4시간 이상 비워주십시오.

연령	1회량	1일 복용 횟수
만 11세 이상	2 캡슐	3회까지가 한도
만 5세 이상 11세 미만	1 캡슐	
만 5세 미만	복용하지 마십시오	

(용법/용량에 대한 주의점)

- 정해진 용법/용량을 반드시 지켜주십시오.
- 만 5세 이상의 어린이에게 복용을 시킬 경우에는 복용량을 지키고 약제가 목에 걸리지 않도록 보호자의 지도 감독하에 복용을 시켜주십시오.
- 캡슐을 꺼낼 때는 오른쪽 그림처럼 캡슐이 들어 있는 PTP 시트의 돌출 부분을 손가락 끝으로 강하게 밀어서 뒷면의 알루미늄 포장을 찢어서 캡슐을 꺼내 주십시오. (실수로 시트가 붙은 채로 먹어버리면 목을 찢르는 등 생각지도 못한 사고로 이어질 수도 있습니다.)



[성분 · 분량]

2캡슐 (만 11세 이상의 1회 복용량)에는 다음 성분이 함유되어 있습니다.

성분	분량	효능
일본약국방 목크레오소트	90mg	대장의 과잉 연동운동의 정상화, 장 내의 수분량 조정, 장 내 정균

첨가물로 마크로골 400, 폴리소르베이트400, 호박산 젤라틴, D-소르비톨, 글리세린, 카라멜, 중쇄중성지방을 함유하고 있습니다.

[보관 및 취급상 주의점]

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관해 주십시오.
- 오용을 막고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.
- 이 약제를 개봉한 후에는 알루미늄 포장의 접는 선에 따라 접고, 반드시 알루미늄 포장 안에 건조제와 함께 보관해 주십시오.
- 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에서 보관해 주십시오.
- 사용기한이 지난 약제는 복용하지 마십시오.

제품에 관한 자세한 내용은 홈페이지(<http://www.seirogan.co.jp>)를 확인해 주십시오.

제조판매원

타이코약품주식회사

564-0032 오사카부 스이타시 우치훈마치 3초메 34번 14호