

※：2023年3月修订

- 本产品以在日本国内进行销售及使用为目的，是经过日本有关保证医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的相关法律认可的医药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。该资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 由于多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任。

SEIROGAN  
Quick C

服用时请务必阅读本说明书。并请妥善保管以便必要时可再次阅读。



大幸薬品

正露丸クイックC

第2类医药品  
肠胃药

## 正露丸Quick C

正露丸Quick C是可以快速溶解的液体胶囊，主成分为日本药典（日本药局方，简称日局）中的“木馏油”，也就是备受青睐一百多年的家庭必备常用药物“正露丸”中的生药成分。日本药典中的“木馏油”是从山毛榉树和松树等树木中提取的透明液体，该成分可调节肠内水分平衡而不会抑制肠道运动，有效帮助肠胃恢复正常状态。如果在上班、上学或外出途中突发腹泻或软便症状，建议尽早服用正露丸Quick C。



### [ 使用时的注意事项 ]

#### 咨询事项



1. 以下人群在服用前请先向医生、药剂师或注册销售员咨询。
  - (1) 正在接受医生治疗的人士
  - (2) 腹泻伴随发热的人士、有血便或黏液便持续的人士
  - (3) 老年人（由于很多老年人的肾脏和肝脏等生理功能下降，因此可能会表现出较强烈的药物作用）。
2. 服用后，如果出现以下症状则有可能为副作用，请立即停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或注册销售员咨询。

有关部位	症状
消化器官	食欲不振、胃部不适

（大量服用本品主成分“木馏油”可能会损伤胃部并降低食欲。）

3. 连续服用5~6日症状仍无改善时，请停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或注册销售员咨询。

（请继续阅读背面的内容）

## [ 功 效 ]

腹泻、因消化不良引起的腹泻、因食物引发的腹泻、水土不服、上吐下泻、泻肚、软便

## [ 用法、用量 ]

请务必用凉开水或温水服用以下用量，以每天3次为限。服用间隔需在4小时以上。

年龄	单次服用量	每天服用次数
11才以上	2颗胶囊	以3次为限
5岁以上，未满11岁	1颗胶囊	
未满5岁	请勿服用	

〔关于用法、用量的注意事项〕

- (1) 请务必遵守规定的用法、用量。
- (2) 5岁以上的儿童服用本品时，为避免弄错服用量或防止胶囊堵塞喉咙，应在监护人的指导监督下喂服。
- (3) 关于取出胶囊的方法，如右图所示，用指尖用力按压装有胶囊的PTP板凸出部以刺破背面的铝箔后取出胶囊。（如果直接连同PTP板误服，可能会刺伤喉咙等引发意外事故）



## [ 成分、分量 ]

2颗胶囊（11岁以上人群的单次服用量）中含有以下成分。

成分	分量	功能
日本药典木馏油	90 mg	使大肠的过度蠕动恢复正常，调整肠道内水分，肠内抑菌

添加物中含有聚乙二醇400、聚山梨酯80、琥珀酰明胶、D-山梨醇、甘油、焦糖、中链甘油三酸酯。

## [ 保管及使用上的注意事项 ]

1. 请保管在儿童无法触及的地方。
2. 为避免误服用以及维持本品质量，切勿转移至其他容器。
3. 本品开封后，请沿铝箔袋的折线折好袋口，务必与铝箔袋中的干燥剂一同保管。
4. 请保管在阴凉干燥处，避免阳光直射。
5. 请勿服用超过使用期限的产品。

关于产品的详细内容，请查阅本公司的官方网站(<http://www.seirogan.co.jp>)。

生产销售商

# 大幸药品株式会社

邮编564-0032 大阪府吹田市内本町3丁目34番14号