

※：2023年3月修訂

- 本產品以在日本國內進行銷售及使用為目的，是經過日本有關確保醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性的相關法律認可的醫藥品。
- 多語種產品資料是根據該產品的日文說明書翻譯而成的，僅供參考。該資料並不保證所記載的內容及該產品本身符合日本以外國家的法律法規。
- 多語種產品資料由提供方（或本公司）臨時翻譯而成，未來可能不提前告知即進行修改或更改。
- 由於多語種產品資料的內容所引起的問題，提供方（或本公司）概不負擔一切責任。

SEIROGAN
Quick C

服用時請務必詳閱本說明書。此外，請妥善保管本說明書以方便於必要時取讀。



大幸藥品

正露丸 Quick C

第2類醫藥品
腸胃藥

正露丸 Quick C

正露丸 Quick C 是能迅速溶解的液體膠囊，主成分是早在100多年前就已問世的居家常備藥『正露丸』中的生藥成分-日本藥典（簡稱日局）木飴油。日本藥典木飴油是取自山毛櫸和松等樹木的透明液體，不會停止腸道的運動，而是調整腸道內的水分均衡，有效幫助腸胃恢復正常狀態。上班、上學時或外出場所突然出現的腹瀉、軟便，建議使用正露丸 Quick C 及早因應。



[使用時的注意事項]

諮詢事項



1. 有下列情況者服用前請向醫師、藥劑師或登錄販賣者諮詢。
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 腹瀉伴隨發燒者，有血便者或黏液便持續者
 - (3) 高齡者（由於很多高齡者腎臟或肝臟等生理機能降低，藥劑的作用會變得比較強。）
2. 服用後發生以下症狀，有可能是產生副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或者登錄販賣者諮詢。

相關部位	症狀
消化器官	食慾不振、胃部不適

（大量服用本藥劑主要成分木飴油可能會引起胃部問題，並造成食慾下降的情形。）

3. 服用5~6天，症狀仍未改善時，請停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或者登錄販賣者諮詢。

（請繼續閱讀背面內容）

[功 能]

腹瀉、消化不良引起的腹瀉、因食物引發的腹瀉、水土不服、上吐下瀉、軟便

[用法與用量]

請務必以冷水或溫水一起服用下列劑量，以1天3次為限。再次服用時，請間隔4小時以上。

年齡	1次量	每日服用次數
11歲以上	2膠囊	3次為限
5歲以上 未滿11歲	1膠囊	
未滿5歲	請勿服用	

〔用法與用量的注意事項〕

- (1) 請務必遵守規定的用法與用量服用。
- (2) 5歲以上的兒童服用時，請在家長的指導監督下服用，以免出現服用錯誤劑量或藥劑卡在喉嚨。
- (3) 如右圖所示，請用指尖用力按壓錠劑PTP膜的凸出部分，壓破背面的鋁箔，取出錠劑服用。（若不慎吞嚥整個膠膜，可能會引發刺傷喉嚨等意外事故。）



[成分與分量]

每2膠囊（11歲以上1次的服用量）中，含有以下的成分。

成分	分量	功能
日本藥典木鱈油	90 mg	使過度蠕動的大腸恢復正常、調整腸道內的水分量、腸道抑菌

添加物含有聚乙烯二醇400、聚山梨醇酯80、琥珀酰明膠、D-山梨醇、甘油、焦糖、中鏈三酸甘油酯。

[保管及使用上的注意事項]

1. 請保管在兒童觸碰不到之處。
2. 為避免誤用或變質，切勿換裝至其他容器中。
3. 本藥劑開封後，請將鋁箔袋沿折線反摺，務必使與鋁箔袋內的乾燥劑一起存放。
4. 請避免陽光直射，保管在陰涼乾燥之處。
5. 請勿服用過期藥物。

產品詳細內容請參考官網（<http://www.seirogan.co.jp>）。

製造銷售商

大幸藥品株式會社

郵遞區號564-0032大阪府吹田市內本町3丁目34番14號