

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

복용하실 때에는 이 첨부문서(설명문서)를 반드시 읽어주십시오. 또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.



大幸薬品

正露丸®

제2종 의약품

위장약

정로환(正露丸)

위장약인 정로환은 100년 이상 전부터 가정에서 복용되는 상비약입니다. 생약인 주성분 일본약국방(약전) 목크레오소트는 장의 정상적인 운동을 멈추지 않으면서도 장 속의 수분균형을 조정하여 속을 정상적인 상태로 돌려놓습니다. 주로 급체나 소화불량처럼 음식물이나 음료가 원인이 되어 일어나는 묽은 변이나 설사 및 스트레스나 감기 등이 원인으로 일어나는 묽은 변이나 설사 등에 뛰어난 효능을 발휘합니다. 이 약품은 일본약국방 목크레오소트를 비롯하여 아선약가루, 황백가루, 감초가루, 진피가루 등의 생약을 배합하고 수분도 포함된 부드러운 알약입니다.

[복용상 주의사항]



금지사항



[지키지 않는 경우 현재의 증상이 악화하거나 부작용, 사고가 일어나기 쉽습니다]

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

지금까지 이 약 또는 이 약의 성분으로 인한 알레르기 증상(발진 및 발적, 가려움, 부종 등)을 경험한 적이 있는 환자.

2. 치통에 사용하는 경우, 이 약은 일시적인 아픔을 억제할 뿐이며 치료 효과는 없으니 아픔이 사라지더라도 가능한 한 서둘러 치과 의사의 치료를 받아주십시오. 그리고 통증이 완화된 경우 이 약을 충치 구멍에서 제거하시고 절대 그 속에 채운 채로 방치하지 마십시오.



상담이 필요한 경우

1. 다음 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담을 해주십시오.

- (1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 발열을 수반한 설사 환자, 혈변이 있는 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
- (3) 임신부, 임신을 하고 있을 것이라고 생각되는 환자 또는 수유중인 환자
- (4) 고령자
- (5) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상이 생긴 적이 있는 환자
- (6) 간이나 신장에 질환이 있는 환자

2. 복용 후에 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용 우려가 있으니 즉시 복용을 중지하고 이 첨부 문서(설명서)를 갖고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.

관련 부위	증상
피부	발진 또는 발적, 가려움, 부종
소화기	메스꺼움 또는 구토, 변비, 식욕부진, 위장의 불쾌감
정신신경계	현기증, 두통

(뒷면으로 이어집니다)

드물게 아래와 같은 위독한 증상이 나타날 수 있습니다. 그 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

증상의 명칭	증상
간 기능성 장애	전신의 권태감, 황달(피부나 흰자위가 노랗게 됨) 등이 나타남.

3. 수일간(5~6일 기준) 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 첨부문서(설명서)를 갖고 의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.
4. 치통에 1, 2회 사용해도 통증이 사라지지 않는 경우에는 사용을 중지하고 이 첨부문서(설명서)를 갖고 치과 의사에게 상담해 주십시오.

[효 능]

묽은 변, 설사, 체증, 구토, 배탈, 소화불량으로 인한 설사, 충치 치통

[용법 · 용량]

1. 다음 양을 식후(가능하면 30분 이내)에 반드시 물 혹은 뜨거운 물과 함께 복용해 주십시오.

연령	1회량	1일 복용 횟수
성인 (만 15세 이상)	3알	3 회
만 11세 이상 15세 미만	2알	
만 8세 이상 11세 미만	1.5알	
만 5세 이상 8세 미만	1알	
만 5세 미만	복용하지 마십시오	

2. 치통에는 1~1/2알을 치와(충치 구멍)에 채워주십시오.

[용법/용량에 대한 주의점]

- (1) 정해진 용법/용량을 반드시 지켜주십시오.
- (2) 만 5세 이상의 어린이에게 복용을 시킬 경우에는 복용량을 지키고 약제가 목에 걸리지 않도록 보호자의 지도 감독하에 복용을 시켜주십시오.

[성분 · 분량]

9알(성인의 1일 최대 복용량)에는 아래 성분이 함유되어 있습니다.

성분	분량	효능
일본약국방 목크레오소트*	400mg	대장의 과잉 연동운동의 정상화, 장 내의 수분량 조정
일본약국방 아선히가루	200mg	장의 운동 조정
일본약국방 황백가루	300mg	건위작용, 장 내 정균
일본약국방 감초가루	150mg	위 점막 장애방지작용, 해독작용
진피가루	300mg	건위작용

첨가물로 계피가루, CMC-Ca, 글리세린을 함유하고 있습니다.

※일반적으로 “크레오소트”라 불리는 것에는 생약인 일본약국방의 목크레오소트 외에 석탄에서 추출한 공업용 크레오소트유(석탄 크레오소트)가 있습니다만, 이것은 원료, 성분 및 용도가 다른 전혀 다른 물질입니다. 또한 발암성 시험의 결과, 일본약국방 목크레오소트에는 발암성은 확인되지 않았습니다.

당사의 제품에 관한 문헌이나 자세한 내용에 관해서는 홈페이지(<http://www.seirogan.co.jp>)를 확인해 주시거나 고객센터실에 문의해 주십시오.

[보관 및 취급상 주의점]

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관해 주십시오.
2. 오용을 막고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.
3. 직사광선을 피하고 서늘한 곳에서 밀폐하여 보관해 주십시오.
4. 사용기한이 지난 약제는 사용하지 마십시오.

제조판매원

타이코약품주식회사

564-0032 오사카부 스이타시 우치훈마치 3초메 34번 14호

01001101