

# 大幸正露丸



Seirogan

吾人日常生活的最大幸福莫過於身體的健康。產出健康活力的源泉，即消化器官系統，它的作用一旦衰退，健康也就會亮起紅燈。尤其當腸胃的活動不順時就容易引起腹痛或腹瀉而營養分的吸收不良，身體狀況日趨欠佳。於是將腸胃調整適正，舒順最為重要。正露丸針對這些日常易發生的疾病，諸如腹瀉，攝食不良等確具功效。特別值得建議的是前往休閒活動，海外旅行時務必攜帶本藥備用。

### 〔適應症〕

腹瀉，消化不良

### 〔用法用量〕

年 齡	一 次 量	一天服用次數
15 歲 以 上	3 粒	3次，餐後服用
11歲以上15歲未滿	2 粒	
8 歲以上11 歲未滿	1.5 粒	
5 歲以上 8 歲未滿	1 粒	

### 〔成份含量〕

本藥九粒中含有以下的成份用量

日本藥典 木飴油……………400mg	日本藥典 阿仙藥末……………200mg
日本藥典 黃柏末……………300mg	日本藥典 甘 草 末……………150mg
陳皮末……………300mg	

### 〔注意事項〕

- 有以下情形者服用前請與醫師或藥師諮商：
  - 過去曾有過敏性症狀者。
  - 併發發燒的腹瀉者。
  - 孕婦，高齡者。
  - 有肝臟或腎臟疾病者。
  - 有血便，持續黏液便者。
  - 接受醫師治療中者。
- 服用時請注意以下事項：
  - 本藥因含有相當於劇藥成份，務必遵守指定的用法與用量。
  - 服用於小兒時請在保護者的指導監督下服用。
  - 本藥勿服用於未滿5歲的小兒。
  - 服用於5歲的小兒時請小心藥劑不滯留在喉嚨上。
  - 本藥切勿使用於“效能”以外的目的。
  - 本藥服用時務必與水或白開水服用，無水或白開水就絕不能服用。
  - 本藥服用時絕不可與其他的止瀉藥併用。
- 服用中或服用後請注意以下事項：
  - 本藥的服用呈現過敏性症狀(例如：發疹，發紅，騷癢等)時應終止服用，並請與醫師或藥師諮商。
  - 服用本藥後偶而會有食慾不振，胃部不舒感等。
  - 服用後仍不見症狀改善時應停止服用，並請與醫師或藥師諮商。

### 〔保管與處理上的注意〕

- 請保管於小孩拿不到的地方。
- 為避免誤用與保持品質絕對勿換裝到其他的容器。(本公司提供的攜帶用容器除外)
- 請勿將其他的藥物混入本藥。
- 本藥是稍微濕潤的丸劑。開封後妥為加蓋，防直射日光照到，盡量存於陰涼處。
- 本藥誤入眼睛時立即以水沖洗並求診於專門醫師。
- 本藥誤與皮膚附著時可用肥皂與溫水沖洗。
- 本藥因含有特殊氣味的成份(主成份木飴油)，服用後加蓋完全後保存。
- 本藥的氣味吸附到衣服時儘速以平常方法洗衣在通風良好處乾燥。

本藥的使用結果，倘有其他不同的症狀等的感覺之處，敬請向購買藥局商店或下記藥商連絡詢問。

製造廠 **大幸藥品株式会社**  
日本大阪府吹田市內本町3丁目34番14号

藥 商 **日商大幸股份有限公司台灣分公司**  
台北市中山北路2段9號6樓之2  
電話 (02)2567-9604